

## KULLANMA TALİMATI

**DROSER 180 mg/ 20 mL burun damlası, çözelti**

**Yalnızca burun içine uygulanır.**

- *Etkin madde* : Sodyum klorür
- *Yardımcı maddeler* : Deiyonize su.

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.*

### **Bu Kullanma Talimatında:**

- 1. DROSER nedir ve ne için kullanılır?***
- 2. DROSER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler***
- 3. DROSER nasıl kullanılır?***
- 4. Olası yan etkiler nelerdir?***
- 5. DROSER'in saklanması***

**Başlıkları yer almaktadır.**

### **1. DROSER nedir ve ne için kullanılır?**

DROSER etkin madde olarak sodyum klorür içerir.

DROSER, 20 ml'lik damlalıklı, PE kapaklı, PE şişelerde sunulmuştur.

DROSER burun tıkanıklığında, burun salgısı kıvamını düşürerek burun tıkanıklığının giderilmesinde kullanılır.

Ayrıca soğuk algınlığı, nezle, bulunulan ortam koşullarının (sıcaklık ve nem) değişmesiyle seyreden burun içi dokusunun kuruması hallerinde; burun içi dokunun nemlendirilmesi, tıkanıklığın önlenmesi ve burun içi dokudaki olası şişkinliklerin normale dönmesine, dolayısıyla solunumun rahat ve kolay yapılmasına yardımcı olur.

## **2. DROSER'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

### **DROSER'i ařađıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Ürünün ierisindeki maddelerden herhangi birine ařırı duyarlılıđı olduđu bilinen bireylerde kullanılmamalıdır.

### **DROSER'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Geerli deđildir.

### **DROSER'in yiyecek ve iecek ile kullanılması:**

Geerli deđildir.

### **Hamilelik:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

DROSER'in gebe kadınlarda kullanımına iliřkin yeterli veri mevcut deđildir. Hayvanlar üzerinde yapılan alıřmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal geliřim /ve-veya/ dođum /ve-veya/ dođum sonrası geliřim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

Gerekli olmadıka gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik döneminde kullanımında anneye sađlayacađı yarar ile bebekte meydana gelebilecek potansiyel riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danıřınız.*

### **Emzirme:**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Sodyum klorür'ün insan ya da hayvan sütü ile atıldıđına iliřkin yetersiz/sınırlı bilgi mevcuttur. Sodyum klorür'ün süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik/toksikolojik veriler nedeniyle memedeki ocuk aısından bir risk olduđu göz ardı edilemez. DROSER emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon döneminde kullanımında anneye sađlayacađı yarar ile bebekte meydana gelebilecek potansiyel riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

### **Araç ve makine kullanımı**

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

### **DROSER'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Geçerli değildir.

### **Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

Kolloidal gümüş ve gümüş nitrat çözeltileri ile gümüş klorür halinde çökebilir.

*Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### **3. DROSER nasıl kullanılır?**

#### **Uygun kullanım ve doz / uygulama sıklığı için talimatlar:**

Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmemişse;

Yetişkinlerde günde 3-4 defa 1-2 veya 4'er damla.

#### **Uygulama yolu ve metodu:**

Burun deliğine damlatılarak uygulanır.

#### **Değişik yaş grupları:**

##### **Çocuklarda kullanım:**

Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmemişse;

Bebek ve çocuklarda günde 1-2 defa 1-2'şer damla olarak her bir burun deliğine tatbik edilmelidir.

##### **Yaşlılarda Kullanım:**

Özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

#### **Özel kullanım durumları**

##### **Böbrek/Karaciğer yetmezliği:**

Geçerli değildir.

*Eğer DROSER'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden fazla DROSER kullandıysanız:**

*DROSER'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**DROSER'i kullanmayı unutursanız:**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.*

**DROSER ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:**

Geçerli değildir.

**4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm ilaçlar gibi, DROSER'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir)

Yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Seyrek (1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Çok seyrek (10 000 hastanın birinden az görülebilir)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

**Aşağıdakilerden biri olursa, DROSER'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :**

- Alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DROSER'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

Geçerli değildir.

**Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:**

Geçerli değildir.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### Yan etkilerin raporlanması

Kullanma talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. DROSER’in saklanması**

*DROSER’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.*

**Dikkat: Şişe açıldıktan sonra 5 gün içinde kullanılmalıdır.**

**Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra DROSER’i kullanmayınız.*

*Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DROSER’i kullanmayınız.*

*Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na belirlenen toplama sistemine veriniz.*

**Ruhsat Sahibi** : DrogSan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.  
Oğuzlar Mah. 1370. sok. No: 7/3  
06520 Balgat-ANKARA

**Üretim yeri** : DrogSan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.  
06760 Çubuk-ANKARA

Bu kullanma talimatı 27/12/2017 tarihinde onaylanmıştır.