

KULLANMA TALİMATI

VARİDOS 450 mg / 50 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 500 mg; saflaştırılmış mikronize flavonoid fraksiyonu bulunmaktadır. Bir fraksiyon;

Diosmin.....450 mg

Hesperidin 50 mg

şeklinde ifade edilen flavonoid fraksiyonlarına eşdeğerdir.

Yardımcı maddeler: Jelatin (sığırdan elde edilmiştir), sodyum nişasta glikolat (tip A), mikrokristalize selüloz, talk, magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat, hipromelloz, gliserol, titanyum dioksit, sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, polietilen glikol 6000.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak size reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük doz** kullanmayınız.*

Bu Kullanma Talimatında:

1. **VARİDOS nedir ve ne için kullanılır?**
2. **VARİDOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **VARİDOS nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **VARİDOS'un saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. VARİDOS nedir ve ne için kullanılır?

VARİDOS kutuda, PVC/Al blisterde 30 ve 60 adet pembe-turuncu renkli, bir yüzü çentikli, oblong film kaplı tabletler içermektedir.

VARİDOS, venotonik ve venoprotektör grubuna aittir. Alt ekstremitelerde, venöz tonüs yetmezliği üzerinde etkilidir.

VARİDOS;

- Kronik venöz yetersizliğinde:
 - ağırlık ve şişkinlik hissi, venöz bacak ödemi
 - ağrı
 - gece gelen kramplar,
- Hemoroid krizlerine ait fonksiyonel belirtilerin tedavisinde kullanılmaktadır.

2. VARİDOS'u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VARİDOS'u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

- Eğer etkin maddeye veya VARİDOS'un içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik).

VARİDOS'u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

- Akut hemoroid krizlerinde:
 - Bu ilacın uygulanması, diğer anal şikayetlerin spesifik tedavisi için uygun değildir.
 - Tedavi kısa süreli olmalıdır. Hemoroid semptomları 15 gün içinde geçmediği takdirde doktorunuza başvurulmalı ve tedavi gözden geçirilmelidir.
- Venöz dolaşım hastalıklarında:
 - Bu ilaç sağlıklı bir yaşam çerçevesinde uygulanmalıdır. Güneşe ve sıcağa maruz kalmayınız, uzun süre ayakta durmayınız ve aşırı kilo almamaya özen gösteriniz.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

VARİDOS'un yiyecek ve içecek ile kullanılması

Dozlar yemek ile birlikte alınmalıdır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yeterli çalışma olmadığından hamilelik döneminde kullanımdan kaçınılmalıdır.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Araç ve makine kullanımı

VARİDOS, araç veya makine kullanmanızı etkilemez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

VARİDOS'un herhangi bir ilaçla bilinen bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza ve eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. VARİDOS nasıl kullanılır?**Uygun kullanım ve doz sıklığı için talimatlar:**

Venöz yetersizliğinde: Günde iki tablet, biri öğle diğeri akşam yemeği ile birlikte alınır.

Hemoroid krizlerinde: İlk dört gün, günde 6 tablet; sonraki 3 gün, günde 4 tablet alınır.

Uygulama yolu ve metodu:

Tabletler yemek ile birlikte alınır. Tabletler yeterli miktarda sıvı ile bütün olarak yutulur.

- Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.
- İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.
- Doktorunuz VARİDOS ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Belirtiler devam ettiği sürece VARİDOS ile tedavinize devam ediniz.
- *Eğer VARİDOS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

Kullanmanız gerekenden daha fazla VARİDOS kullandıysanız:

VARİDOS'dan almanız gerekenden fazlasını almışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

VARİDOS'u kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

VARİDOS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, VARİDOS'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:	10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın:	10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan:	100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek:	1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek:	10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor:	Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Mide rahatsızlıkları
- Rahatsızlık hissi

Bunlar VARİDOS'un hafif yan etkileridir ve tedavinin kesilmesine neden değildir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr adresinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. VARİDOS’un Saklanması

VARİDOS’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra VARİDOS’u kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, *VARİDOS’u kullanmayınız.*

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat Sahibi: Drog-san İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Oğuzlar Mah. 1370. sok. 7/3
Balgat-ANKARA

Üretim yeri: Drog-san İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Esenboğa Merkez Mah. Çubuk Cad. No:31
06760 Çubuk – Ankara

Bu kullanma talimatı 21/09/2018 tarihinde onaylanmıştır.